

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: DIURENIL®

Insumos ativos: Rhus toxicodendron, Sarsaparilla, Urtica urens

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentação comercial: frasco de vidro âmbar contendo 20 mL, com gotejador atóxico

Forma farmacêutica: solução oral

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO - ACIMA DE 12 (DOZE) ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada mL de DIURENIL® contém:

Rhus toxicodendron.....5CH.....	álc.30%(v/v).....	0,33 mL
Sarsaparilla.....5CH.....	álc.30%(v/v).....	0,34 mL
Urtica urens.....5CH.....	álc.30%(v/v).....	0,33 mL

Veículo: álcool de cereais bidestilado

Graduação alcoólica final: 30%

33 gotas equivalem a, aproximadamente, 1 mL do medicamento

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

DIURENIL® é indicado como auxiliar no tratamento da gota, dores articulares, gotosas e reumáticas, dores e rigidez nas costas, inchaço articular e nas afecções relacionadas ao aparelho urinário como cólicas renais e dor ao terminar de urinar.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O mecanismo de ação deste medicamento baseia-se no princípio da “cura do semelhante pelo semelhante”, descrito na Matéria Médica (GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M. e TORCK, M. - **Matiere Medicale Homeopathique**, 3.^a ed., França; Édition Boiron, 1989).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as contraindicações do medicamento DIURENIL®.

Devido ao fato de conter álcool na composição, convém evitar o uso em pessoas sob tratamento com medicação incompatível com o álcool ou em recuperação do alcoolismo.

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem fazer uso do medicamento DIURENIL® sob orientação médica.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite gotejar sob a língua, por produzir ardência causada pela presença de álcool.

Evite as tomadas próximas às refeições. Tomar o medicamento, no

mínimo, 15 minutos antes ou após as refeições.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre reações adversas do medicamento DIURENIL®.

Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 30%.

DIURENIL® possui, em sua formulação, insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo.

Incompatibilidade Rhus toxicodendron: Apis mellifica.

Inimigo Sarsaparilla: Aceticum acidum.

Até o momento, são desconhecidas interações no uso do medicamento DIURENIL® associado a alimentos ou bebidas alcoólicas.

Até o momento, são desconhecidas alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento DIURENIL®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: líquido, incolor e com odor alcoólico.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Posologia Sugerida:

Adultos

Nas crises: Diluir 10 gotas de DIURENIL® em 15 mL de água (três colheres de chá) e tomar de hora em hora, ou conforme orientação médica.

Como tratamento preventivo: Diluir 10 gotas de DIURENIL® em 15 mL de água (três colheres de chá) e tomar de 8 em 8 horas, ou conforme orientação médica.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor, ou o modo de tomar sugerido nesta bula até remissão total dos sintomas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as reações adversas do medicamento DIURENIL[®].

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Na eventualidade de superdosagem acidental, poderá ser aplicada terapia sintomática (sintomas apresentados) com auxílio médico, levando em consideração de que não há evidências descritas de intoxicações agudas com medicamentos homeopáticos.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro no Ministério da Saúde: M.S. n.º 1.0247.0051.001-7

**Farmacêutica Responsável: Dr.^a Giselle da Costa Mateus
CRF-PR 16959**

Empresa Titular do Registro:

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464

sac@wphomeopatia.com.br

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 02/01/14.



Dr. Waldemiro Pereira
HOMEOPATIA Desde 1933

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



RECICLÁVEL