

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: LYCOGASTRIN®

Insumos ativos: Calcarea carbonica, Carbo vegetabilis, Lycopodium clavatum

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentação comercial: frasco de vidro âmbar contendo 20 mL, com gotejador atóxico

Forma farmacêutica: solução oral

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO - ACIMA DE 12 (DOZE) ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada mL de LYCOGASTRIN® contém:

Calcarea carbonica.....6CH.....âlc.30%(v/v).....0,33 mL

Carbo vegetabilis.....6CH.....âlc.30%(v/v).....0,33 mL

Lycopodium clavatum.....6CH.....âlc.30%(v/v).....0,34 mL

Veículo: álcool de cereais bidestilado

Gradação alcoólica final: 30%

33 gotas equivalem a, aproximadamente, 1 mL do medicamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

LYCOGASTRIN® é indicado como auxiliar no tratamento das disfunções gastro-hepáticas como: mau hálito, eructações, regurgitações, náuseas, atonia gastrintestinal, digestão lenta, fraca, pirose, dispepsia, gastralgias, sensibilidade na região epigástrica, flatulência, distensão abdominal, cólica hepática, congestão hepática e insuficiência hepática.

Calcarea carbonica - Atua como auxiliar na digestão lenta, fraca, mau hálito, regurgitação ácida, eructações azedas e náuseas. Atua também como auxiliar na cólica hepática, flatulência abdominal e distensão abdominal.

Carbo vegetabilis - Atua como auxiliar na atonia, flatulência, pirose, gastralgias, dispepsia, sensibilidade na região epigástrica, eructações, abdômen distendido e náuseas.

Lycopodium clavatum - Atua como auxiliar nos distúrbios gástricos, hepáticos e intestinais como dispepsia, pirose, náuseas, eructações, regurgitações, gastralgias, digestão lenta, atonia gastrintestinal, flatulência, abdômen distendido, congestão hepática, insuficiência hepática e dores hepáticas.

2. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as contraindicações do medicamento LYCOGASTRIN®.

Devido ao fato de conter álcool na composição, convém evitar o uso em pessoas sob tratamento, ou com medicação incompatível com o álcool, ou em recuperação do alcoolismo.

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem fazer uso do medicamento LYCOGASTRIN® sob orientação médica.

3. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Evite gotejar sob a língua, por produzir ardência causada pela presença de álcool.

Evite as tomadas próximas às refeições. Tomar o medicamento, no mínimo, 15 minutos antes ou após as refeições.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre reações adversas do medicamento LYCOGASTRIN®.

Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 30%.

4. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

LYCOGASTRIN® possui em sua formulação insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo.

Inimigo Calcarea carbonica: Baryta carbonica.

Incompatibilidades Calcarea carbonica: Bryonia alba e Sulphur.

Incompatibilidade Carbo vegetabilis: Kreosotum.

Inimigo Lycopodium clavatum: Sulphur.

Incompatibilidade Lycopodium clavatum: Coffea cruda.

Até o momento, são desconhecidas interações no uso do medicamento LYCOGASTRIN® associado a alimentos ou bebidas alcoólicas.

Até o momento, são desconhecidas alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento LYCOGASTRIN®.

5. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e data de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: líquido, incolor e com odor alcoólico.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Administração Via Oral

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Posologia Sugerida:

Adultos

Diluir 6 gotas de LYCOGASTRIN® em 15 mL de água (três colheres de chá) e tomar de 8 em 8 horas, ou conforme orientação médica.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor, ou o modo de tomar sugerido nesta bula até remissão total dos sintomas.

7. REAÇÕES ADVERSAS

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as reações adversas do medicamento LYCOGASTRIN®.

8. SUPERDOSE

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Na eventualidade de superdosagem acidental, poderá ser aplicada terapia sintomática (sintomas apresentados) com auxílio médico, levando em consideração de que não há evidências descritas de intoxicações agudas com medicamentos homeopáticos.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro no Ministério da Saúde: M.S. n.º 1.0247.0050.001-1

**Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus
CRF-PR 16959**

Empresa Titular do Registro:

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial
Farmacêutico Ltda.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464

sac@wphomeopatia.com.br

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 07/01/14.



Dr. Waldemiro Pereira
HOMEOPATIA Desde 1933



RECICLÁVEL

V02-BPS